

Grotex Complex

Herbicida

Características: GROTEX COMPLEX es un herbicida para el control en postemergencia de malas hierbas de hoja ancha, que se presenta en forma de concentrado soluble y dotado de selectividad en los cultivos.

Composición: 2,4-D ácido (sal amina) 34,5% p/v (345 g/L) + MCPA ácido (sal amina) 34,5% p/v (345 g/L)

Formulación: Concentrado Soluble.

Nº de Registro: 19.436

Dosis y usos autorizados

- Cebada y avena. Efectuar una sola aplicación de 0,7 l/ha entre final de ahijado e inicio del encañado.
- Centeno y triticale: Efectuar una sola aplicación de 0,7-1,2 l/ha entre final de ahijado e inicio del encañado.
- Trigo. Efectuar una sola aplicación de 0,7-1,2 l/ha entre final de ahijado e inicio del encañado.
- En trigo de ciclo corto, aplicar la dosis baja.
- Céspedes y Prados de gramíneas: Efectuar una sola aplicación de 0,7-1,2 l/ha en cultivos establecidos en primavera.

Se aplicará en pulverización a baja presión, con un volumen de caldo de 200 - 400 litros de agua/hectárea.

PLAZO DE SEGURIDAD: Deben transcurrir 15 días entre la última aplicación y la entrada de ganado. Esperar 8 semanas entre la aplicación del producto y la siembra del cultivo en la alternativa.

MODO DE EMPLEO

En el momento de la aplicación, la temperatura debe ser superior a 12 °C, y para obtener la máxima eficacia, esta temperatura debe mantenerse durante los días siguientes al tratamiento.

No se debe utilizar el producto cuando existen cultivos sensibles emergidos (crucíferas, leguminosas, frutales de hoja caduca, olivo, girasol, remolacha, tomate, vid, pepino, estramonio, tabaco y cultivos de flores ornamentales y de arbustos frutales) a menos de 20 metros. La aplicación se efectuará mediante pulverización inferior a cuatro atmósferas, con un consumo de caldo mínimo a distribuir por hectárea de 200 litros. La proporción de gotas menores a 100 micras no será superior al 2%. Las temperaturas en el momento de la aplicación deben ser inferiores a 20 °C y los tratamientos se suspenderán cuando la velocidad del viento sea superior a 1,5 m/s.

Este herbicida debe almacenarse en lugar seco, fresco y ventilado, no debe compartir el local con semillas, abonos y otros productos fitosanitarios. Los aparatos que se utilicen para la distribución de herbicidas hormonales deben reservarse únicamente para ese uso.

Clasificación Toxicológica



DISTRIBUIDO POR

BRANDT®

BRANDT EUROPE, S.L.
Ctra. Carmona - Guadajoz Km 3.1
41410 Carmona (Sevilla)
Tlf. 954 19 62 30 // Fax 954 19 62 40