

Cabor

Fungicida - Bactericida

- Guisantes verdes, judías verdes: 0,6-1% (400-833 l/ha)
- Lechugas y similares: 0,6-1% (400-833 l/ha) para bacteriosis, alternaria y antracnosis y 0,38-1% (400-1000 l/ha) para mildiu.
- Olivo: 0,38-0,83 (60-100 ml/m²) para repilo y 0,6-0,61 (60-63 ml/m²) para tuberculosis.
- Ornamentales herbáceas y leñosas: 0,6-1% (400-833 l/ha uso profesional y 40-63 ml/m² uso no profesional)
- Patata: 0,38-1,25% (400-1000 l/ha) para mildiu, 0,6-1,25% (400-833 l/ha) para alternaria.
- Pimiento: 0,6-1% (400-833 l/ha pulverización normal con tractor, 450-833l/ha pulverización manual).
- Tomate: 0,6-1% (400-833 l/ha pulverización normal con tractor, 450-833l/ha pulverización manual) para bacteriosis, alternaria y antracnosis y 0,38-1% (400-1000 l/ha pulverización normal con tractor, 450-1000l/ha pulverización manual)

PLAZO DE SEGURIDAD ENTRE EL ÚLTIMO TRATAMIENTO Y LA RECOLECCIÓN

- Tomate y berenjena: 10 días.
- Brécol, coliflor, olivo, patata, pimiento: 14 días.
- Bulbos hortícolas, Cucurbitáceas de piel comestible, guisantes verdes y judías verdes: 3 días.
- Alcachofa, cucurbitáceas de piel no comestible, fresal, lechugas y similares, puerro: 7 días
- Almendro, avellano, frutales de hueso, de pepita, nogal, ornamentales herbáceos y leñosos y pistacho: no presenta plazo de seguridad.

MODO DE EMPLEO

Añadir agitando, evitando la formación de grumos, la cantidad necesaria de producto sobre un pequeño volumen de agua y mezclar esta papilla con el resto del líquido.

Se recomienda preparar la cantidad de caldo a utilizar, evitando guardar restos para aplicaciones posteriores.

Clasificación Toxicológica



ATENCIÓN

DISTRIBUIDO POR

BRANDT®

BRANDT EUROPE, S.L.
Ctra. Carmona - Guadajoz Km 3.1
41410 Carmona (Sevilla)
Tlf. 954 19 62 30 // Fax 954 19 62 40
www.brandteurope.com