

DENTAREN

INSECTICIDA

Características: DELTAREN es un insecticida a base de deltametrin, insecticida piretroide de amplio espectro, con acción por contacto e ingestión, para su uso en diversos cultivos.

Composición: Deltametrina 2,5 % p/v (25 g/l)

Formulación: Concentrado emulsionable.

Nº de Registro: ES-00572

USOS Y DOSIS AUTORIZADOS:

Tratamientos insecticidas en los siguientes cultivos:

Ajo, cebolla y puerro. Contra: Orugas (Agrotis sp. (AGROSP) y Agrotis segetum (AGROSE)). **Almendro.** Contra: Pulgones (Myzus persicae (MYZUPE)). **Tomate y berenjena.** Contra: Pulgones (Aphis gossypii (APHIGO), Macrosiphum euphorbiae (MACSEU), Myzus persicae (MYZUPE)); Orugas (Heliothis sp. (HELISP), Helicoverpa armigera (HELIAR), Chrysodeixis chalcites (PLUSCH), Tuta absoluta (GNORAB), Agrotis segetum (AGROSE), Autographa gamma (PYTOGA), Spodoptera exigua (LAPHEG), Spodoptera littoralis (SPODLI)). **Calabacín.** Contra: Pulgones (Aphis gossypii (APHIGO), Myzus persicae (MYZUPE)); Orugas (Helicoverpa armigera (HELIAR), Autographa gamma (PYTOGA), Spodoptera littoralis (SPODLI)). **Frutales de pepita.** Contra: Pulgones (Aphis pomi (APHIPO), Aphis spiraecola (APHISI), Aphis fabae (APHIFA), Aphis gossypii (APHYGO), Macrosiphum euphorbiae (MACSEU), Myzus persicae (MYZUPE), Rhopalosiphum insertum (RHOPIN), Dysaphis plantaginea (DYSAPL)); Orugas (Cydia pomonella (CARPPO)). **Vid (uva de mesa y de vinificación).** Contra: Polilla del racimo (Lobesia botrana (POLYBO)). **Olivo.** Contra: Polilla (Prays oleae (PRAYOL) (únicamente en la generación antófaga)). **Patata.** Contra: Escarabajo de la patata (Leptinotarsa decemlineata (LPTNDE)). **Pepino y pepinillo.** Contra: Pulgones (Aphis gossypii (APHIGO), Hyperomyzus lactucae (HYPELA)); Orugas (Agrotis ipsilon (AGROY), Agrotis segetum (AGROSE), Helicoverpa armigera (HELIAR), Spodoptera sp. (SPODSP)). **Melón.** Pulgones (Aphis gossypii (APHIGO), Myzus persicae (MYZUPE)); Orugas (Autographa gamma (PYTOGA), Agrotis sp. (AGROSP), Helicoverpa armigera (HELIAR), Spodoptera littoralis (SPODLI), Spodoptera exigua (LAPHEG), Agrotis ipsilon (AGROY), Agrotis segetum (AGROSE)). **Sandía.** Contra: Pulgones (Aphis gossypii (APHIGO), Macrosiphum euphorbiae (MACSEU)); Orugas (Autographa gamma (PYTOGA), Helicoverpa armigera (HELIAR), Spodoptera littoralis (SPODLI), Spodoptera exigua (LAPHEG)). **Lechuga.** Contra: Orugas (Helicoverpa armigera (HELIAR), Spodoptera exigua (LAPHEG), Chrysodeixis chalcites (PLUSCH), Hyperomyzus lactucae (HYPELA), Nasonovia ribisnigri (NASORN), Agrotis sp. (AGROSP)).

DOSIS DE APLICACIÓN Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Aplicar mediante pulverización foliar siguiendo las siguientes indicaciones:



BRANDT EUROPE, S.L.
Ctra. Carmona-Guadajoz Km 3.1
41410 Carmona (Sevilla)
Tlf. 954 19 62 30 // Fax 954 19 62 40

DENTAREN

INSECTICIDA

Cultivo	Vol. Caldo	Número y momento de aplicaciones	Dosis
Frutales de pepita y almendro	1000 l/ha	1-2 aplicaciones, aplicar al inicio de la plaga (BBCH >10) No aplicar durante la floración (BBCH 60-69)	0,5 l/ha
Olivo	1000 l/ha	Aplicar 1 sola aplicación, aplicar durante la floración BBCH 62 (20% de flores abiertas)	0,3-0,4 l/ha
Tomate, berenjena, ajo, calabacín, cebolla, lechuga, melón, pepino, pepinillo, puerro y sandía	300-1000 l/ha	1-2 aplicaciones, aplicar al inicio de la plaga (BBCH >10)	0,5 l/ha
Patata	600-1000 l/ha	1-2 aplicaciones, aplicar al inicio de la plaga (BBCH >10)	0,5 l/ha
Vid	800-1000 l/ha	1-2 aplicaciones, aplicar al inicio de la plaga (BBCH >10)	0,5 l/ha

INTERVALO ENTRE APLICACIONES: 14 días.

PLAZO DE SEGURIDAD: Entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos con destino al consumo humano o ganadero o, en su caso, entrada de ganados, han de transcurrir al menos: 3 días en tomate, berenjena, calabacín, pepino, pepinillo, melón, sandía y lechuga; 7 días en frutales de pepita, vid, patata, cebolla, puerro y ajo; y 30 días en almendro. No procede fijar plazo de seguridad en olivo.

CONDICIONES GENERALES DE USO: Aplicar por pulverización. El producto formulado no puede ser usado durante el período de floración a una dosis de aplicación mayor a 6,25 g s.a./ha.

Clasificación Toxicológica

Atención



Distribuido por:

BRANDT®

BRANDT EUROPE, S.L.
Ctra. Carmona-Guadajoz Km 3.1
41410 Carmona (Sevilla)
Tlf. 954 19 62 30 // Fax 954 19 62 40