

Grotex

Herbicida

Características: GROTEX es un herbicida para aplicar en postemergencia de malas hierbas de hoja ancha, que se presenta en forma de concentrado soluble y dotado de una excelente selectividad en los cultivos.

Composición: MCPA (sal potásica) 40% p/v (400 g/L)

Formulación: Concentrado Soluble.

Nº de Registro: 17.226

Dosis y usos autorizados

- Cebada, Trigo, Avena, Centeno y Triticale: 1,5 - 3 l/ha. Aplicar entre el final del ahijado y el comienzo del encañado.
- Pastos de Gramíneas: 3 l/ha. Aplicar durante la primavera.
- Maíz: 1,5 - 2 l/ha. Aplicar cuando el cultivo tenga 4 hojas.
- Arroz: 1,25 l/ha. Aplicar entre el final del ahijado y el comienzo del encañado.
- Cítricos: 1,5 - 2,5 l/ha. Aplicar antes de la floración y sólo en el ruedo del árbol.
- Olivo: 2 - 3 l/ha. Aplicar antes de la floración y sólo en el ruedo del árbol.
- Frutales de pepita: 3 l/ha. Aplicar únicamente en la línea de cultivo.
- Áreas no cultivadas: 3 l/ha. Realizar una única aplicación al año.

Utilizar en todos sus usos un volumen de agua de 400 litros por hectárea.

PLAZO DE SEGURIDAD: Deben transcurrir 15 días entre la última aplicación y la entrada de ganado. En el caso de arroz, frutales, cítricos, olivo y áreas no cultivadas, no procede.


Precauciones de empleo:

En el momento de la aplicación, la temperatura debe ser superior a 12 °C, y para obtener la máxima eficacia, esta temperatura debe mantenerse durante los días siguientes al tratamiento.

No se debe utilizar cuando existen cultivos sensibles emergidos (crucíferas, leguminosas, frutales de hueso y pepita, olivo, girasol, remolacha, tomate, vid, pepino, estramonio, tabaco y cultivos de flores ornamentales y de arbustos frutales) a menos de 20 metros. La aplicación se efectuará mediante pulverización inferior a cuatro atmósferas, con un consumo de caldo mínimo a distribuir por hectárea de 200 litros. La proporción de gotas menores a 100 micras no será superior al 2%. Las temperaturas en el momento de la aplicación deben ser inferiores a 20 °C y los tratamientos se suspenderán cuando la velocidad del viento sea superior a 1,5 m/s.

Este herbicida debe almacenarse en lugar seco, fresco y ventilado, no debe compartir el local con semillas, abonos y otros productos fitosanitarios. Los aparatos que se utilicen para la distribución de herbicidas hormonales deben reservarse únicamente para ese uso

Clasificación Toxicológica



DISTRIBUIDO POR

BRANDT®

BRANDT EUROPE, S.L.
Ctra. Carmona - Guadajoz Km 3.1
41410 Carmona (Sevilla)
Tlf. 954 19 62 30 // Fax 954 19 62 40