

OSAKA 30

INSECTICIDA

Características:

OSAKA 30 es un insecticida con actividad por contacto e ingestión para su uso en vid. Contiene indoxacarb, una sustancia activa del grupo de la oxadiazina (IRAC 22A), que actúa bloqueando los canales del sodio de las células nerviosas y causa una pobre coordinación de movimientos, parálisis y la muerte del insecto. Indoxacarb muestra un fuerte efecto de choque y también propiedades repelentes, dejando de alimentarse el insecto inmediatamente, lo que ayuda a proteger el cultivo.

Composición: Indoxacarb 30% p/p (300 g/kg)

Formulación: Granulado dispersable en agua (WG)

Nº de Registro: ES-00843

Usos y dosis autorizados:

CULTIVO	PLAGA/EFEECTO	DOSIS (Kg/ha)	PS (días)
Vid (uva de mesa y vinificación)	Polilla del racimo	0,125	Uva de mesa: 3 Uva para vinificación: 10

PS: Plazo de seguridad

NP: No procede establecer plazo de seguridad

MODO DE EMPLEO:

Aplicar en pulverización foliar mecánica a las dosis indicadas en la tabla siguiendo las siguientes recomendaciones:

Vid: Aplicar a partir de la aparición del órgano floral (BBCH 53), utilizando un volumen de caldo de 400-800 l/ha. Realizar un máximo de 2 aplicaciones con un intervalo de 10 días. No aplicar durante la floración del cultivo BBCH 60-70.

Preparación de la mezcla, aplicación y limpieza

No preparar una cantidad de caldo superior a la requerida para el tratamiento.

Para la preparación del caldo, llenar la mitad del tanque con agua limpia y poner en marcha la agitación.

Añadir la cantidad de SINDOXA necesaria para la superficie a tratar y completar con agua. Mantener la agitación del caldo durante el tratamiento.

Limpiar el equipo de aplicación inmediatamente después del uso.



BRANDT EUROPE, S.L.
Ctra. Carmona-Guadajoz Km 3.1
41410 Carmona (Sevilla)
Tlf. 954 19 62 30 // Fax 954 19 62 40

OSAKA 30

INSECTICIDA

GESTIÓN DE LAS RESISTENCIAS

Debe usarse en alternativamente con insecticidas que comprendan diferentes modos de acción.

No utilizar dosis reducidas.

Solo debe aplicarse cuando la población de plagas alcanza el umbral recomendado en la región/cultivo.

Usar otras medidas como rotación de cultivos.

OBSERVACIONES

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

Clasificación Toxicológica



Peligro

BRANDT®

BRANDT EUROPE, S.L.
Ctra. Carmona-Guadajoz Km 3.1
41410 Carmona (Sevilla)
Tlf. 954 19 62 30 // Fax 954 19 62 40