

Trade

HERBICIDA

Características: Características: TRADE es un herbicida selectivo sistémico para el control en post-emergencia de malas hierbas gramíneas, que se absorbe rápidamente a través de las hojas. Contiene como sustancia activa fluazifop-P-butyl, compuesto del grupo de los ariloxifenoxipropionatos (HRAC A), que actúa inhibiendo síntesis de ácidos grasos mediante inhibición de la acetil CoA carboxilasa (ACCasa).

Composición: Fluazifop-P-Butil 12,5% p/v (125 g/l)

Formulación: Concentrado emulsionable.

Nº de Registro: 25.056

Uso y dosis autorizados

Cultivo	Agente	Dosis (L/ha)	Nº aplicaciones	Volumen de caldo (L/ha)	Plazo de seguridad (días)
Ajos, cebolla, chirivía, espárrago, pepino, zanahoria	Gramíneas anuales	1,25	1	200-600	28
Algodonero (únicamente para uso textil)	Gramíneas anuales	1,25	1	200-600	NP
Berenjena	Gramíneas anuales	1,25	1	200-600	30
Colza, girasol, leguminosas de grano	Gramíneas anuales	1,25	1	200-600	90
Lechugas y similares	Gramíneas anuales	1,25	1	200-600	42
Ornamentales herbáceas, ornamentales leñosas	Gramíneas anuales	1,25	1	200-600	NP
Patata	Gramíneas anuales	1,25	1	200-600	90
Remolacha azucarera	Gramíneas anuales	1,25	1	200-600	56
Soja	Gramíneas anuales	1,25	1	200-600	75
Tabaco	Gramíneas anuales	1,25	1	200-600	NP

MODO DE EMPLEO:

Para uso profesional, en cultivos al aire libre.

Aplicar el producto mediante pulverización al suelo con tractor, con las hierbas ya nacidas (1-3 hojas en el caso de cultivos herbáceos y cuando la mala hierba tenga una altura de 10-50 cm para el caso de tratamientos en cultivos leñosos), utilizando la cantidad necesaria de agua para conseguir una buena cobertura (200 - 600 L/ha) y las dosis indicadas en la tabla.

Aplicar en post-emergencia del cultivo y con las malas hierbas en post-emergencia precoz (Ballico, avena loca, alpiste, rebrotes de cereal, Alopecuros). Aplicar las dosis más bajas contra avena y Alopecuros y las más altas contra Ballico.

En Ornamentales leñosas, aplicar cuando la mala hierba está en crecimiento activo y tenga una altura de 10-50 cm o bien, para el caso del Sorghum halepense, cuando éste presente una altura no superior a 25 cm.

BRANDT EUROPE, S.L.
Ctra. Carmona-Guadajoz Km 3.1
41410 Carmona (Sevilla)
Tlf. 954 19 62 30 // Fax 954 19 62 40

Trade

HERBICIDA

OBSERVACIONES:

- Es necesario adicionar un mojante compatible autorizado.
- No controla Poa.
- En tratamientos en cultivos leñosos, evitar mojar las hojas y partes verdes del cultivo.
- Evitar la deriva a cultivos de cereales colindantes. No sembrar cereales hasta transcurridos 3 meses del tratamiento con el herbicida.
- Para evitar el desarrollo de resistencia de algunas especies gramíneas, especialmente Alopecurus myosuroides, se deben establecer las siguientes medidas:
 - El número de aplicaciones en cultivos de hoja ancha debe limitarse a 1 aplicación por ciclo de cultivo.
 - En caso de repetidas aplicaciones de herbicidas para el control de la hierba dentro de una temporada de cultivo o en campañas agrícolas consecutivas, solo se debe utilizar herbicidas con un modo de acción diferente.
 - Como en ocasiones la resistencia de las gramíneas puede basarse en un metabolismo modificado y la resistencia cruzada entre los diferentes modos de acción no se puede excluir, el limitar la aplicación y la alternancia de herbicidas debe ser apoyado por medidas agrícolas adicionales. Para reducir al mínimo la presión de las malas hierbas, se recomienda el arado profundo del suelo y la siembra tardía.
- El preparado no se usará en combinación con otros productos.

Clasificación Toxicológica



Distribuido por:

BRANDT®

BRANDT EUROPE, S.L.
Ctra. Carmona-Guadajoz Km 3.1
41410 Carmona (Sevilla)
Tlf. 954 19 62 30 // Fax 954 19 62 40