

# Tralofop

## HERBICIDA

**Características:** QUIZALOFOP-P-ETIL 5% EC es un herbicida sistémico para aplicación en pulverización, recomendado para el control de malas hierbas gramíneas en post-emergencia precoz. Se caracteriza por ser absorbido por las hojas y translocado por toda la planta, con movimiento en el xilema y floema y acumulación en los tejidos meristemáticos.

**Composición:** Quizalofop-etil 5% P/V (50 gr/L)

**Formulación:** Concentrado emulsionable.

**Nº de Registro:** 24.812

**Dosis y usos autorizados.**

CULTIVO	Malas hierbas controladas	Dosis (l/ha)	PS(días)
Ajo y cebolla	Gramíneas anuales	1-2	55
	Gramíneas vivaces	1-3	
Algodonero, colza lino, soja	Gramíneas anuales	1-2	90
	Gramíneas vivaces	1-3	
Garbanzo, guisantes para grano, guisantes verdes, judías para grano, judías verdes, lentejas	Gramíneas anuales	1-2	54
	Gramíneas vivaces	1-3	

**Forma y época de aplicación:** Aplicar desde el desarrollo de la segunda hoja (BBCH12) hasta final del crecimiento longitudinal (BBCH39). En post-emergencia de las malas hierbas.

Girasol	Gramíneas anuales	1-2	45
	Gramíneas vivaces	1-3	
Patata	Gramíneas anuales	1-2	56
	Gramíneas vivaces	1-3	
Remolacha azucarera	Gramíneas anuales	1-2	60
	Gramíneas vivaces	1-3	
Alfalfa, tabaco, trébol y veza	Gramíneas anuales	1-2	21
	Gramíneas vivaces	1-3	
Berenjena y tomate	Gramíneas anuales	1-2	56
	Gramíneas vivaces	1-3	
Fresales	Gramíneas anuales	1-2	42
	Gramíneas vivaces	1-3	
Ornamentales herbáceas, leñosas	Gramíneas anuales	1-2	NP
	Gramíneas vivaces	1-3	

**Forma y época de aplicación:** Sólo al aire libre. Aplicar desde el desarrollo de la segunda hoja (BBCH12) hasta el final del crecimiento longitudinal BBCH39. En post-emergencia de las malas hierbas

Cítricos	Gramíneas anuales	1-2	35
	Gramíneas vivaces	1-3	

**Forma y época de aplicación:** Aplicar desde las primeras hojas visibles (BBCH12) hasta fin de floración (BBCH69)

En post-emergencia de las malas hierbas.

Forestales	Gramíneas anuales	1-2	NP
	Gramíneas vivaces	1-3	

**Forma y época de aplicación:** Espacios abiertos, viveros, coníferas, frondosas. Aplicar desde el desarrollo de la segunda hoja (BBCH12) hasta final del crecimiento longitudinal (BBCH39).

En post-emergencia de las malas hierbas

Frutales de hoja	Gramíneas anuales	1-2	35
	Gramíneas vivaces	1-3	

**Forma y época de aplicación:** Aplicar desde primeras hojas desplegadas (BBCH12) hasta estadio de balón del órgano floral (BBCH59). En post-emergencia de las malas hierbas

Vid	Gramíneas anuales	1-2	35
	Gramíneas vivaces	1-3	

**Forma y época de aplicación:** Aplicar desde dos hojas desplegadas (BBCH12) hasta inflorescencias desarrolladas completamente y flores separándose (BBCH57). En post-emergencia de las malas hierbas

BRANDT EUROPE, S.L.  
Ctra. Carmona-Guadajoz Km 3.1  
41410 Carmona (Sevilla)  
Tlf. 954 19 62 30 // Fax 954 19 62 40

# Tralofop

HERBICIDA

## MODO DE EMPLEO:

Aplicar al aire libre en pulverización normal con tractor con un volumen de caldo de 300-400 l/ha. Realizar una única aplicación por campaña en post-emergencia del cultivo.

## OBSERVACIONES:

En la aplicación del producto deben tomarse precauciones para que la deriva de la pulverización no alcance cultivos de cereales colindantes.

Esperar 3 meses antes de sembrar cereales en parcelas tratadas con TRALAFOP

Alternar productos con diferente modo de acción en caso de que para el control de las malas hierbas se requiera repetir el tratamiento.

El producto no se usará en combinación con otros productos.

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales (cultivos agrícolas, plantaciones agrícolas, forestales) no destinados al público en general. Producto no autorizado en ámbitos distintos de la producción primaria agraria definidos en el artículo 46 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre.

## Clasificación Toxicológica

PELIGRO



Distribuido por:

**BRANDT**®

BRANDT EUROPE, S.L.  
Ctra. Carmona-Guadajoz Km 3.1  
41410 Carmona (Sevilla)  
Tlf. 954 19 62 30 // Fax 954 19 62 40