

# Traxi 38 SC

## Fungicida

**Composición:** Oxicloruro de cobre (expresado en Cu)... 38% p/p (380 g/kg)

**Formulación:** Suspensión concentrada.

**Nº de Registro:** 23.557

### APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADOS

CULTIVOS	ENFERMEDAD	VOL. CALDO	Nº APLICAC.	DOSIS %	P.S.
Frutales de hueso (1)	Abolladura, bacteriosis, cribado	800	1	0'3	N.P
Frutales de pepita (2)	Moteado	800	1	0'3	N.P
Olivo	Repilo	800	2	0'3	14
Tomate	Alternaria, antracnosis, mildiu	600-1000	4	0'3	10

**Olivo:** intervalo entre aplicaciones 21-25 días

**Tomate:** intervalo entre aplicaciones 7 días

Plazo de seguridad: Intervalo de tiempo mínimo que ha de transcurrir, entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o ganadero ó entrada de ganados.

### PRECAUCIONES

Observar precauciones por la fitotoxicidad propia del cobre, sobre todo en zonas frías y húmedas, en algunas variedades de frutales y otros cultivos.

### Clasificación Toxicológica



DISTRIBUIDO POR:

**BRANDT**®

BRANDT EUROPE, S.L.  
Ctra. Carmona - Guadajoz Km 3.1  
41410 Carmona (Sevilla)  
Tlf. 954 19 62 30 // Fax 954 19 62 40  
[www.brandteurope.com](http://www.brandteurope.com)