

FOLYZOL

FUNGICIDA

Características:

FOLYZOL es un fungicida sistémico de amplio espectro, con efecto preventivo, curativo y erradicante. Se caracteriza por su alta eficacia en el control de hongos causantes de enfermedades como oídios, botritis, royas, moteados, monilia y otros.

Composición: Tebuconazol 250 g/L (25% p/v)

Formulación: concentrado emulsionable (EC)

Nº de Registro: 24.814

CONDICIONES GENERALES DE USO

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Nº aplicaciones (intervalo mínimo)	Volumen caldo (l/ha)	P.S. (días)	Forma y época de aplicación (Condic. Específico)
Manzano	Oídio y moteado	0,06 - 0,09% (60-90 ml/100 litros agua) (máx. 1 l/ha, a partir formación de frutos máx. 0,8 l/ha)	1	-	7	Aplicar en primavera o comienzos verano.
Peral	Oídio, moteado y stemphylium	0,06 - 0,09% (60-90 ml/100 litros agua) (máx. 1 l/ha, a partir formación de frutos máx. 0,8 l/ha)	1	-	7	Aplicar en primavera o comienzos verano.
Melocotonero, nectarino y albaricoquero	Oídio y monilia	0,06 - 0,1% (60-100 ml/100 litros agua) (máx. 1 l/ha, a partir formación de frutos máx. 0,8 l/ha)	1	-	7	Aplicar en primavera o comienzos verano.
Olivo	Repilo	0,06% (60 ml/100 litros agua) (máx. 0,48 l/ha)	1	-	NP	No aplicar hasta finales de invierno o primavera antes de la floración
Vid	Oídio y botritis	0,04 - 0,1% (40-100 ml/100 litros agua) (máx. 0,4 l/ha)	3 (14 días)	-	14	-
Tomate	Botritis, cladosporiosis y esclerotinia	0,04-0,1% (40-100 ml/100 litros agua)	3 (7 días)	500-1000	3	-
Berenjena	Botritis, cladosporiosis, esclerotinia y roya	0,04-0,1% (40-100 ml/100 litros agua)	3 (7 días)	500-1000	3	-
Pepino y calabacín	Botritis, cladosporiosis y esclerotinia	0,04 - 0,1% (40-100 ml/100 litros agua) (máx. 0,5 l/ha)	3 (7 días)	-	3	-
	Oídio	0,05% (50 ml/100 litros agua) (máx. 0,5 l/ha)				
Melón, sandía y calabaza	Botritis, cladosporiosis y esclerotinia	0,04 - 0,1% (40-100 ml/100 litros agua) (máx. 0,5 l/ha)	3 (7 días)	-	7	-
	Oídio	0,05% (50 ml/100 litros agua) (máx. 0,5 l/ha)				
Trigo y cebada	Oídio, roya, septoria y helmintosporium	1 l/ha	2 (15 días)	200-400	35	-
Triticale	Septoriosis	1 l/ha	1	200-400	35	-
Avena y centeno	Helmintosporium, oídio, roya y septoria	1 l/ha	2 (21 días)	100-500	35	Aplicar en fin de floración: todas las espiguillas han terminado la floración, pero todavía pueden permanecer algunas anteras deshidratadas.

FOLYZOL

FUNGICIDA

MODO DE EMPLEO

Aplicar al aire libre mediante pulverización normal con tractor dirigida al suelo, excepto en olivo que será dirigida hacia arriba.

Producto no autorizado en ámbitos distintos de la producción primaria agraria definidos en el artículo 46 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre.

PRECAUCIONES

Es recomendable el uso de Folyzol en estrategia con otros fungicidas de acción y espectro complementario con la finalidad de evitar la aparición de resistencias que pudieran reducir la eficacia del producto. Folyzol es activo sobre diversas royas de los géneros Puccinia y Uromyces

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA

ATENCIÓN



BRANDT®

BRANDT EUROPE, S.L.
Ctra. Carmona-Guadajoz Km 3.1
41410 Carmona (Sevilla)
Tlf. 954 19 62 30 // Fax 954 19 62 40